



FICHA TECNICA DEL PRODUCTO FORMULADO

Phos-AI[®] 80 WP

FUNGICIDA AGRÍCOLA
POLVO MOJABLE WP:

Ingrediente activo: Fosetil aluminio (Tris-o etil fosfonato de aluminio)... 800 gr/kg

Ingredientes aditivos:..... 200 g/kg

GENERALIDADES

PhosAI[®] 80 WP es un fungicida sistémico recomendado para aplicaciones preventivas en plantas de crecimiento activo, protegiendo el interior de éstas contra el ataque de los hongos patógenos, especialmente los pertenecientes a la familia de los Peronosporales.

Al ser absorbido por la planta, se metaboliza rápidamente y es transportado por la savia al conjunto de la vegetación, incluyendo las raíces y los rebrotes que se forman después de la aplicación.

RECOMENDACIONES DE USO

Piña	Podredumbre del corazón de la piña: (<i>Phytophthora parasitica</i>)	2.5 g/l de agua	Tratamiento pre-siembra se efectúa mediante inmersión del colino inmediatamente antes del trasplante, durante 1 minuto. Tratamiento foliar 60 días después de la siembra.	90 días	6 horas
Cítricos	Gomosis o aguado: (<i>Phytophthora spp.</i>)	30 g/árbol	Aplicación foliar cada 90 días. Hacer tres aplicaciones al año. Los tratamientos curativos, después de la aparición de los primeros síntomas, se deben reservar para los casos extremos o cuando la aplicación preventiva no se pueda realizar en el momento oportuno.	30 días	6 horas



P.C. Periodo de carencia (días entre la última aplicación y la cosecha). PR.

PERIODO DE REINGRESO AL ÁREA TRATADA:

Entrar al área tratada cuando el producto haya secado. Si se ingresa antes, se debe usar ropa y equipo de protección.

FRECUENCIA Y ÉPOCAS DE APLICACIÓN:

Aplicar con la aparición de los síntomas de la enfermedad. Fosal 80 WP estimula las defensas de la planta . Rotar con productos de mecanismo de acción diferente

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:

Para el tratamiento presiembra en piña, el producto debe prepararse en un recipiente o caneca de 200 litros de agua, colocando el colino en costales o canastos para ser sumergido posteriormente. Asegurar que el aspersor u otro aplicador estén limpios y tomar el volumen correcto hasta llenar el depósito. Llenar hasta la mitad el contenedor del equipo aspersor y luego adicionar la cantidad recomendada de FOSAL® 80 WP, agregar el resto del agua y agitar hasta lograr una mezcla homogénea. El producto diluido debe ser aplicado solo el día que se mezcló.

COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD:

PhosAI® 80 WP puede tener problemas de compatibilidad cuando es utilizado en mezcla con abonos foliares que contienen nitrógeno, así como con productos a base de cobre. Se debe realizar un ensayo previo a escala, antes de mezclar el producto (especialmente con fungicidas e insecticidas de otras formulaciones). No se debe emplear el producto con formulaciones aceitosas; la formación de una capa de aceite sobre el follaje, impide su penetración en la planta.

No se debe adicionar acidificantes en el tanque de mezcla, ya que **PhosAI® 80 WP** por sus características fisicoquímicas, acidifica el pH del agua. Verifique que la acidez de la mezcla se adapta a las necesidades puntuales de su cultivo. No es fitotóxico para los cultivos en los cuales se recomienda, si se siguen las indicaciones dadas. No hay efectos particulares sobre cultivos sucesivos.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

Generales:

• En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve el paciente al médico y muéstrele esta ficha.

Ojos: • Lave inmediatamente los ojos contaminados con agua pura durante 10 a 15 minutos.

Ingestión: • Si el producto se ha ingerido, enjuagar la boca con agua. Inducir el vómito (únicamente si la persona esta conciente).

Inhalación: • En caso de inhalación, el paciente debe trasladarse a un lugar aireado.



Piel: • Quite la ropa y lave las partes contaminadas del cuerpo con agua y jabón por 20 minutos.

Antídoto: No existe antídoto específico. Se debe dar tratamiento sintomático y de recuperación general.

GUÍA PARA EL MÉDICO

- Síntomas de intoxicación: Irritación ocular, tos, dificultad para respirar, vómito y diarrea.
- Tratamiento: No hay un antídoto específico. Seguir tratamiento sintomático.