

FLU-500

6E-8316-AGROCALIDAD

Broncosecretolítico expectorante

Cada 100 mL contiene:	
Bromhexina	0,50 g
Vitamina C	3,00 g
Eucaliptol	3,00 g
Excipientes c.s.p.	100 mL

Envase x 100 mL
Envase x 1 L
Envase x 1 GaL
Envase x 20 L



INDICACIONES DE USO

flu-500 es un expectorante y mucolítico de acción directa. El Eucaliptol, actúa sobre las células secretoras del tracto respiratorio, ejerciendo a la vez acción antiséptica. La Vitamina C, aumenta la capacidad de defensa del organismo contra las infecciones y el estrés. La Bromhexina, produce aumento de la cantidad de las secreciones traqueo-bronquiales y una disminución de su fluidez, debido a la destrucción de las fibras de mucopolisacáridos que son las que producen una secreción mucosa viscosa, ejerciendo de esta manera una acción expectorante y mucolítica. Producto no tóxico, biodegradable, seguro, no teratogénico, potencializa la acción de los antibióticos, no merma la producción de huevos.

flu-500 está indicado como coadyuvante en el control y tratamiento de todas las afecciones del tracto respiratorio, de naturaleza infecciosa o no, agudas o crónicas, que cursan con secreción de moco y aumento de su fluidez. Estimulante del sistema inmunológico. Cuando la enfermedad es de naturaleza infecciosa se debe acompañar con antibióticos para lograr la recuperación de los animales.

TIEMPO DE RETIRO

Ninguno.

ADVERTENCIAS

MANTENER EL PRODUCTO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

No verter el producto en afluentes como ríos o arroyos.

No reutilizar este envase.

Venta bajo receta médica

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Mantener el envase bien cerrado.

Conservar en un lugar fresco y seco, de 4°C a 32°C y 70% de humedad relativa.

Proteger de la luz solar.

DOSIS SUGERIDA

Para la dosificación de **flu-500**, se puede aplicar la siguiente tabla.

ESPECIE	DOSIS flu-500
AVES	Oral: 0,5 mL flu-500 / L de agua Aerosol: 250 ml de flu-500 por 20 L de agua diariamente
LECHONES	5mL flu-500 / animal
CERDOS	15 mL flu-500 / animal
BOVINOS Y EQUINOS	40 mL flu-500 / animal
TERNEROS Y POTROS	15 mL flu-500 / animal
CONEJOS	1 mL flu-500 / animal

Tabla de dosificación para 1000 aves

EDAD (semanas)	P.V. (kg)	AGUA mL	flu-500 mL
0	60-65	30	15-30
1	140-160	50	25-50
2	400-450	100	50-100
3	700-750	150	75-100
4	1000-1050	200	100-200
5	1500-1600	280	140-280

La dosis en todas las especies, deben aplicarse durante 3 a 5 días seguidos.

La dosis podrá ser modificada a indicación expresa del Médico Veterinario.

FORMA DE ADMINISTRACIÓN

Oral. Disuelto en el agua de bebida.

Aerosol o pulverización.

USO VETERINARIO